

Odontólogo

- 11) Quando ocorre o trauma oclusal cresce o índice de perda de inserção no periodonto e também perda óssea em paciente que já teve doença Periodontal Inflamatória. Assinale a alternativa que não é sinal ou sintoma da presença do trauma oclusal.
- a) Dor na região periodontal.
 - b) Detecção na radiografia de ausência de lâmina dura lateralmente ou na região do ápice do dente.
 - c) Abscesso periodontal.
 - d) **Acentuado desgaste oclusal.**
- 12) Dos microrganismos abaixo citados, o que geralmente aparece em maior quantidade nos estágios tardios de desenvolvimento da placa bacteriana e em bolsas periodontais profundas:
- a) *Actinomyces sp.*
 - b) *Streptococcus intermedius.*
 - c) *Streptococcus alveus.*
 - d) ***Porphyromonas gingivalis.***
- 13) Dentre as alternativas abaixo assinale qual é o distúrbio autossômico-dominante na formação da dentina que apresenta dentes opalescentes e não é associado a doença sistêmica. Nas radiografias os dentes mostram fechamento prematuro das câmaras e canais pulpares.
- a) Dentinogênese imperfeita hipomatura difusa.
 - b) Displasia Dentinária tipo IV.
 - c) Displasia Dentinária tipo I.
 - d) **Dentinogênese imperfeita.**
- 14) O pêfnigo vulgar é uma doença sistêmica acomete a mucosa oral. Qual a origem dessa patologia
- a) **Autoimune.**
 - b) Neoplásica.
 - c) Infecção.
 - d) Infectocontagiosa.
- 15) Quando um paciente cancerígeno é submetido a radioterapia pode ocorrer uma complicação, não infecciosa, oriunda deste tratamento na cavidade oral.
- a) Linfoma gengival.
 - b) **Osteorradionecrose.**
 - c) Estomatite de refluxo.
 - d) Teratogenese pineal.
- 16) Paciente com grande número de lesões cáries ativas, pode ser classificado como portador de:
- a) Cárie crônica.
 - b) Cárie metastática.
 - c) **Cárie rampante.**
 - d) Sialorreia.

17) O controle de placa bacteriana supragengival que utiliza a escova dentaria com ângulo de 45 graus em relação ao eixo longitudinal e pressionando na direção apical contra a margem gengival é classificado como;

- a) Bass.
- b) Esfregação.
- c) Wilbert klay.
- d) Técnica do escovódromo USP.

18) Constituem deveres fundamentais dos profissionais inscritos segundo o código de ética da odontologia exceto:

- a) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação.
- b) Assumir responsabilidade pelos atos praticados.
- c) **Intervir, quando na qualidade de auditor ou perito nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado.**
- d) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes.

19) Observando os prismas de esmalte em relação a dentina subjacente ou a superfície do dente permanente, concluímos que esses prismas formam um ângulo com essas estruturas em torno de:

- a) **90 graus.**
- b) 45 graus.
- c) 180 graus.
- d) 30 graus.

20) Uma mulher de 30 anos grávida de 7 meses e 15 dias, em um procedimento odontológico, é correto afirmar sobre a anestesia a ser administrada.

- a) Anestesia não tem nenhuma interferência à partir de 7 meses de gravidez.
- b) **A bupivacaína atravessa menos a barreira placentária do que a lidocaína.**
- c) A lidocaína é a anestesia mais indicada nesse caso, sendo administrada sem vasoconstrictor.
- d) A metabolização dos anestésicos no fígado fetal é mais rápida do que no fígado dos adultos.

21) A técnica anestésica equivalente à injeção intravascular, por sua ação rápida indicada em casos de pulpite irreversível em molares inferiores em que o bloqueio do nervo alveolar inferior não foi eficiente.

- a) Técnica de Akinosi-Vasirani.
- b) Técnica de Munshi.
- c) **Técnica intra-ossea.**
- d) Técnica endovenosa.

22) Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de preparo cavitário para amálgama.

- a) Mondelli, 1989.
- b) Baratieri, 1989.
- c) Black, 1908.
- d) **Macnamara, 1990.**

23) Na administração de antibióticos em paciente adulto alérgico a penicilina, para o regime recomendado naprofilaxiadeendocarditeinfeciosa,previamente a procedimentos odontológicos.Assinale a alternativa incorreta para a administração nesse paciente.

- a) Amoxicilina 2g.
- b) Clindamicina 600mg.
- c) Cefalexina 2g.
- d) Azitromicina 500mg.

24)Sobre o projeto de política nacional de saúde bucal Brasil sorridente ,é correto afirmar.

- a) As empresasde saneamento terão apoio do Ministério da Saúde para a aquisição dos equipamentos necessários para a implantação da fluoretação da água de abastecimento. Esta é uma das medidas mais eficientes para a prevenção em saúde bucal, já que o flúor na água de consumo tem o poder de reduzir em até 97% a incidência da cárie.
- b) As equipes de saúde bucal passarão a receber insumos para a realização de procedimentosclínicos restauradores e preventivos, bem como para o trabalho de promoção da saúde junto à igreja. Essa ação apoiará o trabalho dos religiosos, evitando a falta de material e a interrupção dos serviços.
- c) As equipes de saúde bucal modalidade II receberão um novo equipo odontológico para quecomecem a atuar com dois consultórios, um para o cirurgião-dentista e outro para o técnico em higiene dental (THD) aumentando, consideravelmente a produção destas equipes.
- d) Foi finalizado o maior e mais completo levantamento em saúde bucal já realizado no país. Aotodo foram mais de 900.000 exames realizados por mais de 80.000 profissionais em 1.250 municípios.

25) O fórceps de numero 17 tem sua indicação nas exodontias dos dentes.

- a) 16 e 26
- b) 17 e 27
- c) 33,34,43 e 44
- d) 36,37,46 e 47

26) Acerca do ionômero de vidro é incorreto afirmar.

- a) Pode ser reforçado por metais e resinas.
- b) Começa a liberar flúor após 48h da manipulação.
- c) É mais biocompatível que o policarboxilado de zinco.
- d) É utilizado em restaurações classe I,III e V.

27)Em relação à anatomia pulpar, o primeiro molar inferiornormalmente apresenta(60% dos casos):

- a) 1 canal radicular central.
- b) 2 canais radiculares.
- c) 3 canais radiculares.
- d) 4 canais radiculares.

28) Éincorreto uso de Óxido de Zinco Eugenol como base nas restaurações fotopolimeriável, pois:

- a) Não possui resistência suficiente.
- b) Impede adesão da resina ao agente adesivo.
- c) Compromete a fotopolimerização do compósito.
- d) Compromete a estética da restauração.

29) A união química entre o ionômero de vidro e a dentinase dá pelo (a):

- a) Força de Van der Waals.
- b) Força de Péricles.
- c) Força de Ligamento.
- d) Força de União.

30) Classifique, segundo Kennedy, paciente que teve perda dos elementos: 18, 17, 16, 15, 14, na maxila; 32, 31, 41, 42 na mandíbula:

- a) Classe I e Classe III.
- b) Classe III e Classe II.
- c) Classe IV e Classe I.
- d) Classe II e Classe IV.