

Técnico de Enfermagem

21) Considerando as informações e as recomendações contidas no Calendário Básico de Vacinação, atualmente vigente, do Ministério da Saúde, é incorreto afirmar que:

- a) A 1^a, 2^a e 3^a dose da Vacina Oral contra Pólio (VOP) devem ser aplicadas, respectivamente, aos 2, 4 e 6 meses de idade.
- b) A 1^a e 2^a dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) devem ser aplicadas, respectivamente, aos 2 e 4 meses de idade.
- c) A dose única da BCG e a 1^a dose da vacina contra Hepatite B devem ser aplicadas logo quando a criança nasce.
- d) A vacina tetravalente (DTP + Hib) protege contra difteria, tétano, coqueluche e meningite meningocócica do tipo B.

22) Nas situações de emergência por trauma, um cuidado que o técnico de enfermagem deve ter, após verificar as funções vitais e o grau de consciência da vítima, é:

- a) Imobilizar o pescoço e o tronco para evitar danos na eventualidade de fraturas de coluna.
- b) Sentar a vítima imediatamente dentro de um carro e enviar para o pronto-socorro.
- c) Virar a vítima em decúbito ventral para evitar aspiração em caso de vômitos
- d) Estimular a vítima a ficar de pé e deambular para evitar o choque.

23) Segundo a Lei do exercício profissional de enfermagem 7.498 de 25/06/1986, cabe ao técnico de enfermagem, EXCETO:

- a) Participar de ações de prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde.
- b) Prevenir e controlar os índices sistemáticos de infecção hospitalar.
- c) Organização e direção os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço.
- d) Atender integralmente o indivíduo, família ou comunidade, considerando seus aspectos biopsicossocial.

24) A hipoglicemia pode ocorrer quando o paciente recebe:

- a) Dose insuficiente de insulina.
- b) Nenhuma insulina.
- c) Doses relativas de insulina.
- d) Dose excessiva de insulina.

25) Na Clínica Médica do hospital da Santa Casa de Misericórdia existem seringas graduadas de 40 ui/ml e frascos contendo Insulina NPH de 80 ui/ml. Necessitando-se administrar 8 ui de hipoglicemiante pela manhã, o total de unidades a serem aspiradas para cumprir a prescrição é de:

- a) 12 ui
- b) 8 ui
- c) 16 ui
- d) 4 ui

26) Sob o aspecto cirúrgico, as feridas incisivas limpas cicatrizam-se por:

- a) Drenagem.
- b) Curativo diário.**
- c) Primeira intenção.
- d) Segunda intenção.

27) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após 24 semanas de gestação e caracteriza-se classicamente por:

- a) Hipotensão e proteinúria.
- b) Hipertensão e proteinúria.**
- c) Hipotensão e hiperglicemia.
- d) Hipertensão e hipoglicemia.

28) A anotação da respiração é utilizada para avaliar o estado do paciente. Deve, portanto, ser feita no gráfico de TPR e PA e também na anotação de enfermagem, com observações referentes a:

- a) Frequência, ritmo e profundidade.**
- b) Horário, número e profundidade.
- c) Qualidade, horário e número.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

29) O período de incubação da difteria, em dias, varia em torno de:

- a) 2 a 5**
- b) 5 a 8
- c) 8 a 12
- d) 12 a 15

30) A vacina antípólio oral, para ter eficácia deve ser conservada, a nível local, numa temperatura entre:

- a) +8 e +10 °C
- b) +2 e +8 °C**
- c) -2 e -4 °C
- d) 0 e +2 °C