

Técnico em Enfermagem

- 21) A penalidade da suspensão, aplicada pelo Conselho Regional de Enfermagem consiste em:
- Proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 26 (vinte e nove) dias.
 - Proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias.
 - Proibição do exercício profissional de enfermagem por prazo indeterminado, variando de acordo com a gravidade da infração.
 - Divulgação nas publicações oficiais apenas do Conselho Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores.
- 22) São recomendações que o técnico de enfermagem deve estar ciente ao administrar a prescrição de Complexo de Hidróxido de Ferro III (2 ml), intramuscular, exceto:
- Não aplicar o medicamento com validade vencida.
 - Utilizar a técnica de aplicação intramuscular em “Z”.
 - A aplicação poderá ser feita na região glútea.
 - É indicado para pacientes com anemias ferropênicas graves como hemocromatose, anemia falciforme, anemia hemolítica e talassemia.
- 23) A icterícia caracterizada pelo aumento dos níveis de bilirrubina se torna visível quando atinge os níveis séricos de 5mg/dl e ocorre em cerca de 50% dos recém-nascidos a termo e 70 % dos recém-nascidos pré-termo, pode-se afirmar que:
- No aumento da bilirrubina direta, teme-se o desenvolvimento da encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus), e o aumento da bilirrubina indireta, a colestase neonatal.
 - A hiperbilirrubina direta é tratada com fototerapia e às vezes com a exsanguinotransfusão.
 - A icterícia fisiológica no RN a termo é transitória, e tem seu pico no 3º ou 4º dia de vida, e normalmente encontra-se anictérico no final da primeira semana de vida.
 - A icterícia ou popularmente conhecida como amarelão, deve ser tratada precocemente com banhos de picão diariamente.
- 24) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente em pessoas com AIDS, diabéticas, desnutridas, alcolistas, idosos doentes e fumantes, afeta os pulmões, rins, ossos e meninges. São agentes etiológicos da tuberculose, exceto:
- Bacilo de Koch.
 - Mycobacterium africanum.
 - Mycobacterium microti.
 - Mycobacterium C. necroti.

- 25) Programa Nacional de Imunização a princípio tem o objetivo de controlar as doenças imunopreveníveis através da disponibilização das vacinas a toda população brasileira, mas mesmo reconhecido seus benefícios ainda há contra-indicação que é:
- Prematuridade ou baixo peso no nascimento. (Excetuam-se o BCG, que deve ser aplicado somente em crianças com mais de 2kg).
 - Tratamento sistêmico com corticosteroide (inferior a duas semanas).
 - Acometido por neoplasia maligna.**
 - Desnutrição.
- 26) Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pelas Resoluções COFEN N° 311/2007, é correto afirmar que:
- É DIREITO - Art. 4° - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
 - É PROIBIDO - Art. 33 - Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
 - É DIREITO E RESPONSABILIDADE - Art. 17 - Prestar informações à pessoa, família e coletividade acerca da prescrição da Assistência de Enfermagem, apenas em casos previsto por lei.
 - É DIREITO Art. 26 - Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
 - É RESPONSABILIDADE E DEVER Art. 72 – Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.
- I , II , IV estão corretas.
 - I e II estão corretas.
 - I , II e V estão corretas.**
 - II , IV e V estão corretas.
- 27) Qual a quantidade de microgotas a correr, em um minuto, para se administrar 500 ml de soro fisiológico a 0,9%, em 5 horas ?
- 100 microgotas/min.**
 - 300 microgotas/min.
 - 330 microgotas/min.
 - 1000 microgotas/min.
- 28) Foi prescrito a um paciente com Diabetes melitus a dose inicial de 45 UI por via subcutânea de Insulina NPH (U – 100). Não tendo disponível a seringa de insulina no ambulatório e, tendo apenas a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5. Quantos ml de insulina devem ser aspirados e administrados ao paciente?
- 0, 15 ml
 - 0, 45 ml**
 - 1,5 ml
 - 2,2 ml

- 29) Ao atender um paciente no setor de emergência, o técnico de enfermagem verifica que um paciente apresenta confusão mental, respiração de Kussmaul e acidótica, náuseas e vômitos, sinais de desidratação e glicemia > 250 mg/dl e pH sérico < 7,3. Esta situação deve ser rapidamente notificada porque retrata:
- a) **Cetoacidose diabética.**
 - b) Intoxicação por salicilatos.
 - c) Desidratação hipernatrêmica.
 - d) Alcalose metabólica.
- 30) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a aids, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. Sobre a AIDS, é correto afirmar que:
- a) **O tratamento constitui em utilizar pelo menos três antirretrovirais combinados, sendo dois medicamentos de classes diferentes, que poderão ser combinados em um só comprimido.**
 - b) Todo soropositivo assintomático não deverá receber vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados devido a pouca concentração de linfócitos T CD4+.
 - c) A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta produção dos linfócitos T CD4 – glóbulos brancos do sistema imunológico - que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por mm³ de sangue.
 - d) Portanto, a cesariana eletiva não deve ser indicada para gestantes HIV+ que realizaram profilaxia antirretroviral combinada durante a gestação ou que usaram apenas monoterapia com AZT por ser a via de maior transmissão vertical.